

この部分を
引き上げてください。

鎮痛消炎薬

第2類医薬品

品番 RXM7

テープ剤

販売名

ロイヒ膏ロキソプロフェン

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

7枚

7cm×10cm

特長

●ロイヒ膏、ロキソプロフェンは、すぐれた鎮痛消炎効果をもつ「ロキソプロフェンナトリウム水和物」を8.1%配合した温感タイプのテープ剤です。●1日1回で痛みの芯まで直接浸透し、つらい患部の痛みに効きます。●無臭タイプなので人前でも臭いが気になりません。

使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください。
 - 1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - 3) 15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください。
 - 1) 目の周囲、粘膜等。
 - 2) 潰瘍、かぶれ、キズぐち。
 - 3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。
- 連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診察を受けてください)

相相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 1) 医師の治療を受けている人。
 - 2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 4) 高齢者。
 - 5) 次の診断を受けた人。気管支ぜんそく
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発赤・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

症状	下痢・軟便
----	-------

- 5～6日間使用しても症状が良くならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(他の疾患の可能性もあります)

その他の注意

入浴する場合は、貼った場所がヒリヒリすることがありますので、必ず30分以上前にはがしてください。また、入浴後は30分以上経過してから使用してください。

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のセパレーター(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。

■用法・用量に関する注意

- 1) 用法・用量を厳守してください。
- 2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状の痛みを治療する薬剤なので、症状がある場所だけ使用してください。
- 3) 1日あたり4枚を超えて使用しないでください。
- 4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- 5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所、1～2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発赤・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- 6) 発熱するもの(コタツ、ホットカーペット、カイロ、電気毛布等)と併用しますと、刺激が強くなる場合がありますので注意してください。

成分・分量(膏体100g中)

ロキソプロフェンナトリウム水和物 8.1g
(黒水物として7.14g)

添加物として、流動パラフィン、ステレン/イソブレン/ステレンブロック共重合体、水素添加ロソングリセリンエステル、ポリソルビチン、ジブチルヒドロキソトルエン、香料(ノニル酸フニルアミド)、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- 3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- 4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度
(独)医薬品医療機器総合機構
TEL 0120-149-931

ニチバン株式会社
〒112-8663
東京都文京区関口2-3-3

お問い合わせ先:お客様相談室

TEL 0120-377218

受付時間: 9:00~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く) 個別

TMは商標です。 日本製 MADE IN JAPAN

NB20C01

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

7枚
10cm×14cm

鎮痛消炎薬 品番 RXL7 第2類医薬品 テープ剤

販売名

ロイヒ膏ロキソプロフェン大判

特長

●ロイヒ膏[®]ロキソプロフェン大判は、すぐれた鎮痛消炎効果をもつ「ロキソプロフェンナトリウム水和物」を8.1%配合した温感タイプのテープ剤です。●1日1回で痛みの芯まで直接浸透し、つらい患部の痛みに効きます。●無臭タイプなので人前でも臭いが気になりません。●股などの広い患部に適した大判サイズです。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 15歳未満の小児。
 2. 次の単位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜炎等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、キズ、くち。
 - (3) みずむし、たむし等又はアレルギー性皮膚病。
 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。
 4. 連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診察を受けてください)

Ⓜ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 次の診断を受けた人。 気管支ぜんそく
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれた場合は中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

症状	下痢・軟便
4. 5〜6日間使用しても症状が良くならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(他の疾患の可能性あります)	

その他の注意

入浴する場合は、貼った場所がヒリヒリすることがありますので、必ず30分以上前にはがしてください。また、入浴後は30分以上経過してから使用してください。

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋内痛、肩袖炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のセパレーター(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。

■用法・用量に関する注意

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場所だけ使用してください。
- (3) 1日あたり2枚を超えて使用しないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1〜2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6) 発熱するもの(コタツ、ホットカーペット、カイロ、電気毛布等)と併用しますと、効果が強くなることがありますので注意してください。

成分・分量(膏体100g中)

ロキソプロフェンナトリウム水和物 8.1g (無水物として7.14g)

添加物として、流動パラフィン、ステレン/ポリブレン/ステレンブロック共重合体、水素添加ジブリン/シリコンエステル、ポリブレン/ステレン、ジブチルヒドロキシルエタン、香料(ニルニルワコニルアミド)、その他2成分を含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手が届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度
(独)医薬品医療機器総合機構
TEL 0120-149-931

二丁子株式会社
〒112-8663
東京都文京区関口2-3-3

お問い合わせ先: お客様相談室
TEL 0120-377218

受付時間: 9:00~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く)

TWは登録商標。 日本製 MADE IN JAPAN

「貼るだけでいい」

