

チェックシート

ご購入の前に、このフローチャートに従って、この医薬品が使用できることをチェックしてください。

「はい」「いいえ」でお答えください。(該当するチェック欄に☑を記入してください)

1 次のいずれかに当てはまりますか？

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある
- 15歳未満である
- 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある

全て「いいえ」

1つ以上「はい」

使用しないでください。

アレルギー症状又はぜんそく発作を起こしたことがある人は、再び起こすおそれがあります。

2 次のいずれかに当てはまりますか？

- 医師の治療を受けている
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある
- 妊婦又は妊娠していると思われる
- 高齢者
- 次の診断を受けた人：気管支ぜんそく

全て「いいえ」

1つ以上「はい」

使用できない場合があるため、使用する前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

3 次に当てはまりますか？

- 現在、連続して2週間以上使用している

いいえ

はい

症状が継続する場合には、医療機関を受診してください。

ロイヒ膏TMロキソプロフェン・ロイヒ膏TMロキソプロフェン大判が使用できます。
製品の外箱の説明書(添付文書)をよく読んで使用してください。

使用の際は、以下のことを守ってください。

- ・ 次の部位に使用しないでください。①目の周囲、粘膜等 ②湿疹、かぶれ、キズぐち ③みずむし・たむし等又は化膿している患部
- ・ 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。
- ・ 連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください)

本剤は痛みや炎症の原因となっている疾患そのものを治療するものではなく、発現している症状をおさえるお薬です。
本剤の使用に際し、ご不明な点がございましたら、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

ご使用前に必ずお読みください

使用開始年月日

ロイヒ膏TMロキソプロフェン・ロイヒ膏TMロキソプロフェン大判

年 月 日

特長

販売名	ロイヒ膏ロキソプロフェン・ロイヒ膏ロキソプロフェン大判	有効成分	ロキソプロフェンナトリウム水和物	含有量	膏体 100g中 8.1g(無水物として 7.14g)
-----	-----------------------------	------	------------------	-----	-----------------------------

このお薬は、有効成分として、非ステロイド性鎮痛消炎薬(NSAIDs)と呼ばれるグループに属するロキソプロフェンナトリウム水和物を含有するテープ剤です。ロキソプロフェンナトリウム水和物は、痛みや炎症の原因物質「プロスタグランジン」の生成を抑え、痛みやはれ等をやわらげます。

効能・効果

このお薬は、腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫に効果を発揮します。

お使いの前に

次の人はこのお薬を使用することはできません

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人(再びアレルギー症状があらわれるおそれがあります)
- 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬*を使用してぜんそくを起こしたことがある人(非ステロイド性消炎鎮痛成分により、再びぜんそく発作を起こすおそれがあります)
- 【※代表的な成分：アスピリン(アセチルサリチル酸)、アスピリンアルミニウム、アセトアミノフェン、イソプロピルアンチピリン、イブプロフェン、インドメタシン、エテンザミド、ジクロフェナクナトリウム、フェルピナク及びロキソプロフェンナトリウム水和物】
- 15歳未満の小児

次の部位には使用しないでください

- 目の周囲、粘膜等(強い刺激や痛みがあらわれるおそれがあります)
- 湿疹、かぶれ、キズぐち(傷ついた皮膚は刺激が生じやすく、湿疹に使用すると症状が悪化するおそれがあります)
- みずむし・たむし等又は化膿している患部(症状が悪化するおそれがあります)

次の人はこのお薬を使用する際に注意が必要です。
使用する前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- 医師の治療を受けている人(医師から処方された薬との重複等により治療に影響を及ぼすおそれがあります)
- 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人(類縁の薬の使用を避ける必要があります)
- 妊婦又は妊娠していると思われる人(胎児に悪影響を与えるおそれがあり、薬の使用には慎重を期す必要があります)
- 高齢者(一般に高齢者は皮膚が弱くなっている傾向があり、また、高齢者で皮膚症状の副作用発現率が高かったとの報告があります。高齢者は使用する部位の皮膚状態に注意が必要です)
- 次の診断を受けた人
気管支ぜんそく(病態を悪化させるおそれがあります)

このお薬は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するものではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、**症状がある場合だけ使用してください。**

用法・用量


用法・用量

表面のセパレーター(フィルム)をはがし、**1日1回**患部に貼付してください。

使い方

- 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm 角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【ロイヒ膏™ロキソプロフェン】1日あたり4枚を超えて使用しないでください



【ロイヒ膏™ロキソプロフェン大判】1日あたり2枚を超えて使用しないでください



- フィルム側を手前にして軽く折り曲げ、中央のフィルムを最初にはがします。
- フィルムをはがした中央の粘着部分を患部に貼り、テープの位置を固定します。
- 片方ずつフィルムをゆっくりはがしながら貼ります。

成分・分量

有効成分	膏体100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 8.1g(無水物として7.14g)
添加物	流動パラフィン、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、水素添加ロジングリセリンエステル、ポリイソブチレン、ジブチルヒドロキシトルエン、香料(ノニル酸ワニルアミド)、その他2成分

使用上の注意

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、製品の外箱(添付文書)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

このお薬についてのお問い合わせ先は？

- 症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、医師、薬剤師又は登録販売者にお問い合わせください。
- 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

- まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 使用後、次の症状があらわれることがあります。このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、製品の外箱(添付文書)を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

症状 下痢・軟便

- **連続して2週間以上使用しないでください。**
本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、製品の外箱(添付文書)を持って、医師の診療を受けてください。
- 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は、使用を中止し、製品の外箱(添付文書)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 入浴する場合は、貼った場所がヒリヒリすることがありますので、必ず30分以上前にはがしてください。また、入浴後は30分以上経過してから使用してください。
- 発熱するもの(コタツ、ホットカーペット、カイロ、電気毛布等)と併用しますと、刺激が強くなる場合がありますので注意してください。

包装

販売名	ロイヒ膏 ロキソプロフェン	ロイヒ膏 ロキソプロフェン大判
サイズ	7cm×10cm	10cm×14cm
入れ目	7枚×1袋	7枚×1袋

保管及び取扱い上の注意

- このお薬の保管方法は？
 - ・ 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 - ・ 小児の手の届かないところに保管してください。
 - ・ 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3
ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>

【お客様相談室】TEL 0120-377218 受付時間/ 9:00~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く)

2020年10月作成
NB20K01
TMは商標です